

Wir impfen nur die von der STIKO (ständige Impfkommision) empfohlene Impfungen nach folgendem **Impfplan**:

Ab Ende 2. Monat: 1. DTPa, HIB, Polio, HB, PK
4 Wochen später: 2. DTPa, HIB, Polio, HB, PK
4 Wochen später U4: 3. DTPa, HIB, Polio, HB, PK

mit 12 Monaten U6 Meningokokken C

Ab dem 13. Monat: 1. MM+Windpocken
Ab dem 14. Monat: 4. DTPa, HIB, Polio, HB, PK
Ab dem 15. Monat: 2. MMR+Windpocken

Mit 6 Jahren: DTPa Auffrischung vor Schule
Mit 10 Jahren: DTPa Polio Auffrischung
Mit 13 Jahren Mädchen: HPV Gebärmutterhalskrebs 3x
nach 0, 2 Monaten, 6 Monaten

13. - 18. Lebensjahr Hepatitis B f. alle Nichtgeimpften HB
(Grundimmunisierung)

alle 10 Jahre Tetanus-Diphtherie (Auffrischimpfung) Td

Zusätzlich gibt es die Rotavirus-Impfung (Rotarix) nur bei gefährdeten Kindern (Indikationsimpfung).

(Wird nicht von allen Kassen übernommen, Kosten müssen vorgestreckt werden)

DTPa: Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten (Pertussis azellulär)

HIB: Haemophilus-Influenzae B (Hirnhaut-, Kehlkopf entz.)

Polio: Kinderlähmung (Poliomyelitis)

HB: Hepatitis B (schwere Leberentzündung, meist chronisch)

PK: Pneumokokken (Lungen-, Mittelohr-, Hirn-,Hirnhäute.)

MMR: Masern, Mumps, Röteln

HPV: Humanes Papilloma Virus (Gebärmutterhalskrebs)

Impfreaktionen

Eine Reaktion auf eine Impfung ist zum Glück sehr selten geworden, weil die „hightec“ Impfstoffe extrem gut verträglich sind.

Trotzdem kann es bei jeder Impfung zu einer allergischen Reaktion oder einem allergischen Schock kommen. Wir hoffen, dass dieser schlimmste Fall nie eintritt, sind aber durch entsprechendes Training hierauf vorbereitet.

DTPa-, Hib-, Polio-, HB- Impfung: in seltenen Fällen Temperaturerhöhung um 38,5°C (manchmal auch bis 39°C). Ein bis zwei Tage lang ist Unruhe (oder vermehrter Schlaf) möglich, da der Körper sich mit dem Impfstoff auseinandersetzt. Es kann sich am Bein (oder Arm) eine schmerzhaft gerötete Schwellung ergeben. Bei der MMR+Windpockenimpfung kann es um den 10. Tag nach der Impfung zu einem Ausschlag (Impfmasern) und einer leichten Windpockenerkrankung mit Fieber bis 40°C kommen. Diese Nebenwirkung ist extrem selten. Ruhe bewahren, das Bein oder den Arm kühlen und eventuell ein Zäpfchen geben.

Ist Ihr Kind stark beeinträchtigt oder sind Sie beunruhigt, rufen Sie bitte in der Praxis an: 33347
außerhalb der Sprechzeit: 01725602407